


DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風)又はポリオワクチンを異なる回数接種している方へ



# ポリオワクチン接種(単独)のお知らせ

～平成24年9月から不活化ワクチンに切り替わりました～

接種対象者： 生後3 か月から 90 か月に至るまで

予防接種実施規則の一部改正により、接種方法が次のように変わりました。

	平成24年9月1日から	参考(これまで)
ワクチンの種類	不活化ワクチン(単独)	生ワクチン
接種方法	皮下に注射	経口投与(口から飲む)
接種回数	4回(初回3回、追加1回※1)	2回
接種場所	市内の委託医療機関※2	保健福祉センター
実施時期	通年	春・秋のみ


※1 平成24年10月23日より追加接種(4回目)が定期接種(公費)になりました。

※2 医療機関は大阪市ホームページ <http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000282789.html> をご覧いただくか、お住まいの区保健福祉センターにお問い合わせください。

## ▼△不活化ポリオワクチン(単独)の接種方法


今までの接種歴により接種回数が異なります。

予診票は委託医療機関にあります。



不活化ポリオワクチンと4種混合ワクチンの併用は可能です。3種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンの接種から、4種混合ワクチンの接種に途中から変更となる場合には、不活化ポリオワクチンの接種回数が合計4回を超えないよう接種してください。

DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風)又はポリオワクチンを同じ回数接種している方へ



# 4種混合ワクチンのお知らせ

～平成24年11月から接種開始しています～

接種対象者： 生後3か月から90か月に至るまで

予防接種実施規則の一部改正により、接種方法が次のようになります。


## ▼△4種混合ワクチン(DPT-IPV)とは？

ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(不活化)の4種類の混合ワクチンのことを言います。

なお、すでに3種混合ワクチン(DPT)及びポリオワクチンを全て接種済みの方は4種混合ワクチンの接種は不要です。



## ▼△4種混合ワクチンの接種方法(初回3回、追加1回)



### 予診票について

平成25年4月より以前に交付した予防接種手帳を持っている場合、3種混合ワクチンの予診票を読み替えてお使いください。



※現在、4種混合ワクチンの供給量は十分確保されており、4種混合と単独の不活化ポリオワクチンの併用は可能ですので1期初回・追加接種とあわせて合計4回を超えないよう接種してください。

お問い合わせ先：各区保健福祉センター

大阪市保健所 TEL6647-0656 FAX6647-1029

平成26年4月改訂