

“認知症の人をささえるまち大阪”をめざして  
地域で支え合うために認知症を知ろう！



認知症の人をささえるまち大阪宣言

- 認知症に関する知識の理解を深め、早期に認知症に気づき、地域のつながりで認知症の人をささえるまち
- 認知症の人の思いやその人らしさを尊重し、認知症の人やその家族の視点に立って行動するまち
- 外出する、運動する、食事に気をつけるなど、認知症になりにくい生活習慣を実践するまち
- 認知症の状態に応じた質の高い医療・介護サービスが速やかに提供されるまち
- 認知症の人がいきいきと暮らし続けることができるまち

平成30年2月13日

※大阪市は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる社会の実現をめざし、あらゆる世代や立場の人が協力して、認知症の人にやさしいまちづくりに取り組むことを宣言しました。

大 阪 市

# なぜ、認知症について学ぶのですか？

誰もが「もの忘れ」をします。  
ひどくなったと思ったとき、どうしたらよいのでしょうか？

自分や家族の「もの忘れ」は認知症だろうか？  
そう感じたときにどのように対処したらよいのか学びましょう。

認知症には、原因となる病気がいろいろあります。  
なかには「もの忘れ」が目立たない認知症もあります。  
原因となる病気によって治療方法やケア方法が異なることも学びましょう。

誰もがなる可能性のある病気です。  
早期に対応することで進行を遅らせることができます。

予防のためには日頃から頭や体を働かせることが大切です。

認知症になっても家族や地域の助け合いで、  
住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができます。



## \* もくじ \*

誰もがなる  
可能性があるの？

早期受診・早期治療が  
大切なんだって

予防を心がけよう！

認知症とは？、治療について … 2ページ

… 4ページ

本人や介護者を  
支えよう

予防について

本人・家族の気持ちを知ろう … 5ページ

認知症を理解して  
活動をしよう

認知症の人への対応

… 7ページ

認知症サポーターとは？

… 8ページ

相談機関

… 9ページ

気軽に相談して  
ください

# 認知症とは？

認知症とは、共通の症状のある病気のグループの名称です。

認知症は、原因となる病気があります。

## 原因となる病気

- 神経変性疾患 : アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症(ピック病を含む)など
- 脳血管障害 : (脳出血や脳梗塞による)血管性認知症
- 感染性疾患 : クロイツフェルト・ヤコブ病、脳炎、神経梅毒など
- 中毒・栄養障害 : アルコール依存症、ビタミン欠乏症(B1、B12、葉酸)など
- 脳腫瘍 : 原発性や転移性による脳腫瘍
- 頭部外傷によるものなど

※ビタミンを含む食べ物は下記のとおり

認知症とよく似た状態を示す病気の中には、

- うつ状態
- 甲状腺機能低下症
- 慢性硬膜下血腫
- 正常圧水頭症

などのように、早期に治療することで治せるものがあります。

アルツハイマー型認知症のように、早期に治療することで進行を遅らせる治療薬があります。

### ビタミンの多く含まれる食べ物

B1 : 豚肉、玄米、大豆など

B12 : 貝類、魚類、レバーなど

葉酸 : レバー、ほうれんそう、ブロッコリーなど



## 治療について

認知症は治らない病気だから医療機関に行っても仕方ないと  
思わないでください。

早期診断、早期治療が重要です。

### ●早い時期に受診することのメリット

- ・治る病気を見逃さない
- ・アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症の場合は、薬で進行を遅らせることができ、早く使い始めると健康な時間を長くすることができます。
- ・血管性認知症の場合は、高血圧のコントロールなど他の病気の治療を行うことによって進行を防ぐことができます。

進行防止や予防については4ページを

- ・病気が理解できる時点で受診し、少しづつ理解を深めていけば、生活上の障がいを軽減する工夫を自分自身ですることができます。

例えば・・・

\*でかける時に持っていく物は、いつも同じ鞄に入れておく

\*ガス器具ではなく電磁調理器や電気ポットを使う



# 中核症状と認知症の行動・心理症状（BPSD）

認知症の症状には、誰にでも生じる共通の症状としての「中核症状」と、中核症状に環境などさまざまな要因が加わって二次的に生じる「認知症の行動・心理症状(BPSD)」があります。

「認知症の行動・心理症状(BPSD)」は必ずしも生じるものではありません。

また、認知症に影響されていない「健康な部分」もあることを忘れないでください。

## 中核症状（認知症の共通の症状の例）

- 記憶障害：夕食を食べたことを忘れる、最近のエピソードをすっかり忘れてしまうなど
- 失語：言葉が出てこない、言葉の意味を理解できない
- 失行：服の着方がわからない、道具の使い方がわからない
- 失認：視力は問題ないのに目の前にある物が何かわからない、文字盤の時計が読めない
- 見当識障害：時間がわからない、季節感のない服を着る、近所で迷子になる、友人や家族の顔が認識できないなど
- 実行機能障害：料理などの段取りがたてられない

## 認知症に影響されていない健康な部分

- \*昔のこと、体で覚えたことは覚えている。
- \*五感や情緒は豊かに生きている。

### 心理状態

### 身体の状況

### 不適切な環境・ケア

## 認知症の行動・心理症状（BPSD）

### ●精神症状

うつ状態

意欲の低下

妄想

焦燥感

### ●行動障害

徘徊

暴力

異食

昼夜逆転

※この図は、アルツハイマー型認知症を中心とした考え方です。

※ BPSD : Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia

認知症は高齢者だけの病気ではありません。

65歳未満の世代に発症した認知症のことを「若年性認知症」といいます。

若年性認知症は、働き盛りや家庭で大きな役割を担う世代の人に発症し、社会生活・家庭生活への影響が大きいことから、高齢者の認知症とは違った様々な支援が必要です。

《若年性認知症支援ハンドブック》

大阪府のホームページからダウンロードできます。

大阪府 若年性認知症支援ハンドブック 検索