

~不得麻疹、风疹的唯一方法就是接种预防疫苗~

请来接种麻疹·风疹 二联（MR）疫苗吧！



麻疹和风疹传染性强，多发于大城市圈的人群密集的场所。近年来，麻疹方面出现了来自亚洲、非洲、欧洲等海外流行国的访日人员或归国人员携带病毒入境并引发群体性感染的病例报告。

风疹方面则于 2012-2013 年间爆发了大规模疫情，必须予以充分关切。

此外，2017 年全国范围内，每 5 名风疹患者中就有 1 名未满 10 岁，大多数患者未接种疫苗。

麻疹和风疹是一种没有特效疗法、但接种疫苗预防效果显著的疾病。没有免疫力的人如果与患者接触，基本都会出现病症，为了有效预防感染，需要接种 2 次疫苗。

定期接种对象（可免费接种疫苗的年龄）

[1 剂次] 出生后 12~24 个月内（2 周岁生日前一天为止）



把疫苗接种作为宝宝 1 周岁的生日礼物吧！

宝宝满 1 周岁后，从母体带来的免疫力就会消失，因此建议尽早给宝宝接种疫苗。



[2 剂次] 小学入学前 1 年（年长儿：4/1~翌年 3/31）

注：此处的“年长儿”指日本的幼儿园·保育所的最后一年的学龄前儿童。

小学入学前，来接种 2 剂次疫苗吧！

~ 需要接种 2 次疫苗的理由 ~

- ①只接种一次疫苗有时无法提高免疫力，若无法保持免疫力，有可能会感染麻疹。
- ②接种了两次疫苗的儿童中，同时增强麻疹和风疹免疫力的比例达 98%~99%。
- ③麻疹病发时无特效药物治疗，有可能会引发并发症而导致病情恶化。
- ④怀孕时若感染了风疹，可能会引起新生儿先天性风疹综合症。
- ⑤未来升学和就职时，可能会被问及是否接种过麻疹疫苗。



进入 4 月后，请尽早去接种疫苗吧！

委托医疗机构请扫描二维码



1 剂次·2 剂次规定以外的时间接种任意一项疫苗需自行承担 1 万日元左右的费用。

▲▽▲关于接种时间间隔▲▽▲

活疫苗（麻疹风疹）的接种间隔时间须大于 27 天，死疫苗（日本脑炎〈即流行性乙型脑炎〉、流感等）的接种间隔时间须大于 6 天。请有计划地接种疫苗。

▲▽▲关于副作用▲▽▲

接种 1 剂次疫苗后 2 周内可能出现发热（13%）和出疹（3%），通常在 1~3 日内痊愈。接种 2 剂次疫苗时，发热和出疹的几率大为降低。少数情况下会出现脑炎及脑病（100 万~150 万人中出现该情况的不超过 1 人）。

麻疹是什么？



麻疹过去被称为“命运天注定（一旦患上麻疹就会失去性命）之症”。这是一种传染性极强的疾病，如果不接种预防疫苗的话，基本所有人都会感染上麻疹。从患病到康复的时间长达7~10天，因此会对身体造成很大的负担，10人中有1人会因为并发症而住院，因而形成了在全球范围内消除麻疹的目标。。



◆ 传染途径和潜伏期

麻疹病毒通过患者咳嗽或打喷嚏等途径排出体外，经由空气传播、飞沫传播、接触传播等感染。潜伏期约为10~12日。

◆ 症状

主要症状有发热、咳嗽、流鼻涕、眼睛充血和出疹。最初3~4日内体温可达38°C左右，在暂时性消热后，会再次出现高热和皮疹。高热约在3~4天后消退，之后皮疹也会逐渐消失。


◆ 并发症

有支气管炎、中耳炎、肺炎和脑炎，发病率为：100名患者中有5~15人出现中耳炎，1000名患者中有1人出现脑炎。

此外，每10万名患者中，会有1人在数年至十数年后并发一种名为亚急性硬化性全脑炎（SSPE）的慢性脑炎。甚至，麻疹患者的死亡率达一千分之一。

※如果接种预防疫苗，将不会出现这些严重的并发症。

风疹是什么？



由于皮疹和发热症状一般持续3天消退，因此被称为“三日麻疹”。孕妇如果在怀孕初期感染风疹，则容易生下患有先天性风疹症候群（先天性心脏病、白内障、重听）的宝宝。孕妇无法接种风疹疫苗，因此十分有必要在孕前接受接种。此外，为了防止将风疹病毒传染给身边的孕妇，男性接种风疹疫苗也十分重要。



◆ 传染途径和潜伏期

风疹病毒通过患者咳嗽或打喷嚏等途径排出体外，经由飞沫传播感染。潜伏期约为14~21天。

◆ 症状

主要症状有：出现比麻疹颜色略浅的红色皮疹、发热、颈后淋巴结肿大等。此外，也可能出现咳嗽、流鼻涕、眼睛充血等症状。

◆ 并发症

目前已知症状有关节疼痛、血小板减少性紫癜和脑炎。发病率为：3000名患者中，有1人出现血小板减少性紫癜；6000名患者中，有1人出现脑炎。成年人感染风疹的话，比小孩更易引发重症并发症。

【咨询方式】

各区保健福利中心

大阪市保健所传染病对策课 TEL 06-6647-0656

2018年4月