


1) 小児科定点把握疾患

ア RSウイルス感染症

2019年のRSウイルス感染症の報告数は4,179人、定点当たりの報告数の年平均は1.42であった。ここ10年の定点当たりの報告数の平均は0.95であり、2019年は最も多い報告数であった。

RSウイルス感染症は年々流行が早まり、週別定点当たり報告数では、2019年は前年と同時期の第27週から増加し始め、ピークは第37週の5.18であった。

年齢別患者報告数は、1歳の1,403人が最も多く、6～11ヶ月の781人、0～5ヶ月の732人、2歳の719人と続き、3歳以下で全体の95.1%を占めている。



《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.49	0.68	0.60	0.77	0.60	0.74	0.79	0.91	0.93	1.11	1.21	1.68	1.37	1.25	1.02	1.77	1.13	0.73
北部	1.36	1.14	0.93	1.00	0.93	1.29	1.07	1.43	0.93	1.79	1.71	2.86	2.43	1.14	1.00	1.92	1.08	1.23
西部	0.30	0.60	0.90	0.80	1.10	0.80	1.00	1.10	1.20	1.90	1.40	1.40	1.60	2.20	1.00	2.50	2.30	1.80
東部	0.33	0.53	0.40	0.60	0.07	0.33	0.60	0.33	1.00	0.33	0.13	1.07	0.67	0.33	0.60	1.27	0.60	0.27
南部	0.06	0.50	0.33	0.72	0.50	0.61	0.61	0.89	0.72	0.78	1.61	1.44	1.00	1.56	1.39	1.67	0.94	0.17

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.54	0.38	0.46	0.41	0.18	0.34	0.21	0.32	0.50	0.95	0.63	0.93	1.80	1.73	1.36	1.66	3.45	4.53
北部	1.08	0.54	0.46	0.62	0.31	0.23	0.38	0.85	0.92	2.08	1.15	1.62	3.46	2.08	2.38	2.31	6.00	5.92
西部	0.30	0.30	1.30	0.30	0.10	0.20	0.10	0.20	0.10	0.40	0.30	0.40	1.00	2.00	1.60	2.00	3.20	6.22
東部	0.20	0.27	0.07	0.33	0.13	0.27	0.13	0.27	0.47	1.00	1.00	1.00	1.20	1.27	0.47	1.33	3.47	4.27
南部	0.56	0.39	0.33	0.39	0.17	0.56	0.22	0.06	0.44	0.39	0.11	0.67	1.56	1.72	1.22	1.28	1.72	2.89

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	平均
市	5.18	4.95	4.04	4.22	3.98	2.82	2.29	1.82	1.29	0.93	0.73	0.71	0.68	0.73	0.68	0.93	1.42
北部	7.77	8.15	6.62	7.15	6.15	5.00	4.64	3.14	2.14	2.29	0.79	1.43	1.29	1.79	1.36	1.29	2.28
西部	5.22	7.00	5.67	5.00	4.67	2.89	2.89	1.89	1.89	1.11	1.33	1.22	1.22	0.89	0.56	1.33	1.71
東部	3.40	2.27	2.53	2.73	1.80	1.60	0.93	1.40	0.80	0.33	0.67	0.53	0.33	0.27	0.73	0.93	0.92
南部	4.78	3.83	2.61	2.94	3.89	2.22	1.28	1.11	0.72	0.28	0.44	0.06	0.22	0.22	0.17	0.44	1.07

定点あたり報告数 経年変化(2010年第1週～2019年第52週)




イ 咽頭結膜熱

2019年の咽頭結膜熱の報告数は1,131人、定点あたりの報告数の年平均は0.38であった。ここ10年の定点あたりの報告数の平均は0.41である。

週別定点あたり報告数では、夏期と冬期の二峰性の流行をみせ、ピークは第24週の0.71であった。

年齢別患者報告数は、1歳の368人、2歳の182人、3歳の158人と続き、5歳以下で全体の89.1%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.19	0.44	0.26	0.30	0.19	0.25	0.32	0.21	0.25	0.25	0.28	0.19	0.25	0.14	0.27	0.29	0.48	0.21
北部	0.07	0.57	0.29	0.43	0.21	0.43	0.36	0.29	0.14	0.29	0.21	0.14	0.07	0.14	0.38	0.46	0.46	0.08
西部	0.60	0.30	0.30	0.30	0.20	0.10	0.30	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.90
東部	0.20	0.53	0.33	0.20	0.13	0.20	0.27	0.40	0.20	0.27	0.13	0.20	0.20	0.13	0.27	0.33	0.73	0.13
南部	0.06	0.33	0.17	0.28	0.22	0.22	0.33	0.00	0.39	0.22	0.56	0.22	0.44	0.17	0.28	0.17	0.50	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.36	0.43	0.61	0.52	0.50	0.71	0.66	0.64	0.50	0.52	0.48	0.57	0.38	0.54	0.18	0.18	0.43	0.60
北部	0.46	0.69	0.23	0.38	0.38	0.54	0.46	0.69	0.38	0.38	0.46	0.23	0.38	0.31	0.00	0.23	0.46	0.54
西部	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.80	0.30	0.90	0.10	0.40	0.50	0.30	0.00	0.30	0.11
東部	0.53	0.40	0.80	0.53	0.53	0.87	0.80	0.87	0.33	0.40	0.13	0.73	0.13	0.07	0.13	0.00	0.07	0.13
南部	0.11	0.28	0.89	0.72	0.61	0.94	0.89	0.50	0.56	0.83	0.56	0.94	0.56	1.11	0.28	0.39	0.78	1.28

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	平均
市	0.38	0.20	0.15	0.22	0.38	0.27	0.27	0.41	0.32	0.43	0.38	0.46	0.66	0.55	0.55	0.70	0.38
北部	0.15	0.15	0.23	0.00	0.46	0.15	0.21	0.36	0.43	0.14	0.21	0.50	1.07	0.29	0.57	0.29	0.34
西部	0.11	0.22	0.22	0.22	0.11	0.22	0.56	0.44	0.22	0.00	0.33	0.33	0.44	0.33	0.44	0.44	0.31
東部	0.20	0.20	0.00	0.20	0.07	0.27	0.20	0.13	0.13	0.67	0.20	0.27	0.13	0.60	0.40	0.47	0.32
南部	0.83	0.22	0.17	0.39	0.72	0.39	0.22	0.67	0.44	0.67	0.67	0.67	0.89	0.83	0.72	1.33	0.51

定点あたり報告数 経年変化(2010 年第1週～2019 年第52週)




ウ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎


2019年のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は5,135人、定点当たりの報告数の年平均は1.75であった。ここ10年の定点当たりの報告数の平均は1.53である。

週別定点あたり報告数は、初夏と冬期に流行があり、例年と同様の傾向であった。ピークは第51週の3.13であった。

年齢別患者報告数は4歳の772人、5歳の679人、3歳の602人と続いた。



定点あたり報告数 経年変化(2010年第1週～2019年第52週)




エ 感染性胃腸炎

2019年の感染性胃腸炎の報告数は14,067人で、定点当たりの報告数の年平均は4.77であった。ここ10年の定点当たりの報告数の平均は4.55である。

週別定点あたり報告数は春期と、冬期に流行をみせ、ピークは第51週の8.96であった。

0～9歳における年齢別患者報告数は1歳が2,380人と最も多く、2歳の1,617人、3歳の1,408人と続き、0～4歳で全体の56.3%を占めた。



《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	2.14	6.25	4.81	5.88	6.05	6.21	5.54	6.39	5.09	5.70	5.51	4.74	5.18	5.02	6.61	8.70	7.91	3.52
北部	3.07	9.50	6.71	6.86	7.43	7.50	7.29	8.93	6.50	6.29	7.07	5.50	5.29	5.14	7.15	13.38	10.46	6.00
西部	4.90	7.90	6.90	5.70	8.20	9.20	8.10	4.70	3.50	6.70	3.40	5.20	6.50	7.60	7.80	7.40	7.80	7.50
東部	1.33	2.93	2.67	3.60	3.47	2.53	3.00	3.80	4.07	3.73	3.73	3.13	2.67	2.20	3.60	4.27	4.67	1.00
南部	0.56	5.56	3.94	7.11	5.94	6.61	4.89	7.50	5.72	6.33	6.94	5.22	6.44	5.83	8.06	9.72	8.83	1.61

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	5.18	6.25	6.93	6.88	5.77	4.34	3.64	3.77	3.34	3.50	3.11	2.88	2.98	2.05	1.57	2.20	3.13	2.95
北部	8.62	9.85	11.00	9.00	8.23	6.23	5.85	5.00	4.08	4.46	3.00	3.85	3.54	2.23	2.00	3.00	3.23	3.85
西部	5.00	5.80	5.80	5.80	4.20	4.30	3.50	5.70	3.60	3.40	3.40	2.10	3.80	2.60	2.90	1.90	3.00	3.00
東部	3.33	3.47	3.40	4.27	3.73	2.20	1.07	1.60	1.87	2.60	2.67	1.80	1.53	0.93	1.27	1.87	2.33	1.27
南部	4.33	6.22	7.56	8.11	6.56	4.78	4.28	3.61	3.89	3.61	3.39	3.50	3.33	2.56	0.78	2.06	3.78	3.67

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	平均
市	3.00	2.82	2.25	3.24	3.36	2.44	2.55	3.50	3.07	5.59	5.34	6.48	8.09	8.48	8.96	7.16	4.77
北部	3.31	3.15	3.15	4.92	4.69	3.46	2.57	3.57	3.93	4.71	7.50	5.79	7.07	9.79	11.00	8.57	6.04
西部	3.78	3.33	2.33	4.67	4.33	2.00	2.67	3.78	2.33	8.78	7.22	10.67	17.33	13.44	13.89	10.78	5.77
東部	1.40	1.67	1.20	1.47	2.00	1.80	1.87	1.87	1.87	3.40	1.67	3.00	2.47	4.47	3.73	4.20	2.61
南部	3.72	3.28	2.44	2.78	3.06	2.44	3.06	4.67	3.78	6.50	5.78	7.83	8.94	8.33	9.28	6.72	5.10

定点あたり報告数 経年変化(2010 年第1週～2019 年第52週)

