

1 定点把握感染症（性感染症を除く）

大阪市ブロック別区対照表

北部	北区、都島区、東淀川区、旭区、淀川区
西部	福島区、港区、此花区、大正区、西区、西淀川区
東部	中央区、生野区、天王寺区、城東区、浪速区、鶴見区、東成区
南部	阿倍野区、平野区、住之江区、西成区、住吉区、東住吉区



警報・注意報の基準値

対象疾患	警報		注意報
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	—
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	—
感染性胃腸炎	20	12	—
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	—
伝染性紅斑	2	1	—
ヘルパンギーナ	6	2	—
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	—
流行性角結膜炎	8	4	—

2020 年感染症発生動向調査 カレンダー

週	調査対象期間		
1	12/30	～	1/5
2	1/6	～	1/12
3	1/13	～	1/19
4	1/20	～	1/26
5	1/27	～	2/2
6	2/3	～	2/9
7	2/10	～	2/16
8	2/17	～	2/23
9	2/24	～	3/1
10	3/2	～	3/8
11	3/9	～	3/15
12	3/16	～	3/22
13	3/23	～	3/29
14	3/30	～	4/5
15	4/6	～	4/12
16	4/13	～	4/19
17	4/20	～	4/26
18	4/27	～	5/3
19	5/4	～	5/10
20	5/11	～	5/17
21	5/18	～	5/24
22	5/25	～	5/31
23	6/1	～	6/7
24	6/8	～	6/14
25	6/15	～	6/21
26	6/22	～	6/28

週	調査対象期間		
27	6/29	～	7/5
28	7/6	～	7/12
29	7/13	～	7/19
30	7/20	～	7/26
31	7/27	～	8/2
32	8/3	～	8/9
33	8/10	～	8/16
34	8/17	～	8/23
35	8/24	～	8/30
36	8/31	～	9/6
37	9/7	～	9/13
38	9/14	～	9/20
39	9/21	～	9/27
40	9/28	～	10/4
41	10/5	～	10/11
42	10/12	～	10/18
43	10/19	～	10/25
44	10/26	～	11/1
45	11/2	～	11/8
46	11/9	～	11/15
47	11/16	～	11/22
48	11/23	～	11/29
49	11/30	～	12/6
50	12/7	～	12/13
51	12/14	～	12/20
52	12/21	～	12/27
53	12/28	～	1/3



1) 小児科定点把握疾患

ア RSウイルス感染症

2020年のRSウイルス感染症の報告数は374人、定点当たりの報告数の年平均は0.13であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。

RSウイルス感染症は例年、秋から冬にかけて流行がみられるが、2020年においては報告が極めて少なく、流行がみられなかった。

年齢別患者報告数は、1歳の107人が最も多く、0～5ヶ月と6～11か月が同数の73人、2歳の68人と続き、3歳以下で全体の92.0%を占めている。



《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.29	0.57	0.54	0.75	0.41	0.27	0.48	0.32	0.27	0.30	0.36	0.29	0.21	0.23	0.18	0.25	0.04	0.00
北部	0.93	0.57	1.00	1.29	0.57	0.57	0.71	0.36	0.29	0.57	0.50	0.29	0.36	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
西部	0.33	1.00	0.56	1.22	1.00	0.11	0.67	0.78	0.78	0.11	0.44	0.22	0.00	0.22	0.33	0.22	0.11	0.00
東部	0.00	0.33	0.47	0.27	0.20	0.20	0.47	0.00	0.07	0.00	0.33	0.13	0.13	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.56	0.22	0.50	0.17	0.17	0.22	0.33	0.17	0.44	0.22	0.44	0.28	0.22	0.33	0.67	0.00	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.04	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00
北部	0.00	0.00	0.00	0.07	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.22	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.04	0.05	0.02	0.04	0.00	0.05	0.11	0.11	0.05	0.07	0.04	0.13
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.36	0.07	0.14	0.14	0.18
西部	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.06
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.12	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.10

定点あたり報告数 経年変化(2011年第1週～2020年第53週)




イ 咽頭結膜熱

2020年の咽頭結膜熱の報告数は557人、定点当たりの報告数の年平均は0.18であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。

咽頭結膜熱は例年、夏期と冬期の二峰性の流行をみせるが、2020年においては夏期の流行がみられなかった。ピークは第49週の0.43であった。

年齢別患者報告数は、1歳の237人、2歳の98人、3歳と4歳の46人と続き、5歳以下で全体の88.3%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.04	0.41	0.20	0.23	0.36	0.30	0.29	0.23	0.23	0.13	0.34	0.29	0.16	0.09	0.13	0.18	0.05	0.05
北部	0.07	0.43	0.21	0.07	0.36	0.21	0.36	0.14	0.43	0.36	0.79	0.07	0.29	0.07	0.21	0.21	0.00	0.14
西部	0.11	0.00	0.33	0.56	0.44	0.11	0.22	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00
東部	0.00	0.27	0.07	0.20	0.13	0.33	0.27	0.33	0.27	0.00	0.13	0.20	0.07	0.13	0.13	0.20	0.00	0.00
南部	0.00	0.72	0.22	0.22	0.50	0.44	0.28	0.33	0.11	0.11	0.28	0.61	0.22	0.11	0.06	0.22	0.11	0.06

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.04	0.02	0.00	0.04	0.09	0.05	0.07	0.07	0.11	0.14	0.16	0.21	0.09	0.14	0.19	0.19	0.14
北部	0.00	0.07	0.07	0.00	0.14	0.07	0.07	0.14	0.00	0.07	0.07	0.07	0.21	0.07	0.07	0.14	0.07	0.29
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.20	0.00	0.13	0.20	0.20	0.00	0.07	0.33	0.13	0.20
南部	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.22	0.06	0.06	0.06	0.28	0.28	0.28	0.33	0.22	0.28	0.22	0.39	0.06

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.39	0.28	0.12	0.23	0.14	0.29	0.36	0.30	0.14	0.21	0.29	0.29	0.43	0.18	0.30	0.27	0.07	0.18
北部	0.64	0.14	0.21	0.36	0.00	0.21	0.29	0.29	0.07	0.29	0.29	0.29	0.64	0.21	0.36	0.50	0.07	0.21
西部	0.10	0.10	0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.10	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.30	0.10	0.20	0.09
東部	0.60	0.33	0.07	0.33	0.47	0.40	0.33	0.07	0.07	0.33	0.27	0.60	0.53	0.07	0.27	0.13	0.07	0.17
南部	0.17	0.44	0.06	0.18	0.00	0.35	0.53	0.65	0.24	0.18	0.47	0.12	0.41	0.24	0.29	0.29	0.00	0.23

定点あたり報告数 経年変化 (2011 年第1週～2020年第53週)




ウ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2020年のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は2,361人、定点あたりの報告数の年平均は0.79であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。

週別定点あたり報告数は、第14週までは例年と同様の推移であったが、以後報告数が減少し例年のような夏期と冬期の流行がみられなかった。

年齢別患者報告数は4歳の355人、5歳の320人、6歳の265人と続いた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.36	1.82	1.63	2.55	3.11	2.54	1.95	2.34	1.75	1.75	1.46	1.07	1.16	1.30	0.63	0.46	0.36	0.32
北部	0.57	1.07	1.36	0.79	3.07	2.50	2.29	2.36	1.43	1.71	1.07	0.93	1.21	1.71	0.86	0.43	0.43	0.36
西部	1.22	1.78	2.11	4.22	2.89	2.89	2.44	3.11	2.44	2.44	1.56	1.33	1.00	1.00	0.56	0.78	0.11	0.44
東部	0.07	1.47	1.00	1.20	2.73	2.07	0.87	1.47	1.20	0.67	1.40	0.60	0.87	0.53	0.40	0.27	0.07	0.07
南部	0.00	2.72	2.11	4.22	3.56	2.78	2.33	2.67	2.11	2.33	1.78	1.44	1.44	1.78	0.67	0.50	0.67	0.44

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.32	0.36	0.23	0.34	0.34	0.25	0.35	0.63	0.67	0.60	0.33	0.26	0.37	0.32	0.16	0.23	0.28	0.37
北部	0.50	0.43	0.21	0.50	0.50	0.36	0.07	0.57	0.79	0.50	0.14	0.43	0.29	0.43	0.14	0.43	0.36	1.00
西部	0.44	0.56	0.67	0.22	0.33	0.10	0.00	0.10	0.30	0.60	0.60	0.10	0.70	0.00	0.30	0.10	0.10	0.10
東部	0.00	0.27	0.07	0.13	0.07	0.13	0.93	0.93	0.60	0.20	0.07	0.33	0.07	0.07	0.00	0.07	0.33	0.20
南部	0.39	0.28	0.17	0.44	0.44	0.33	0.28	0.72	0.83	1.00	0.56	0.17	0.50	0.61	0.22	0.28	0.28	0.17

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.65	0.49	0.25	0.57	0.41	0.57	0.63	0.43	0.73	0.45	0.39	0.45	0.64	0.48	0.64	0.55	0.34	0.79
北部	0.57	0.36	0.43	0.86	0.50	0.50	0.71	0.64	0.64	0.36	0.50	0.50	0.71	0.57	0.93	0.36	0.43	0.78
西部	0.70	0.50	0.10	0.20	0.40	0.60	0.50	0.10	0.30	0.10	0.40	0.30	0.70	0.60	0.40	0.60	0.60	0.84
東部	0.47	0.33	0.27	0.33	0.13	0.33	0.20	0.47	0.47	0.47	0.40	0.40	0.67	0.20	0.20	0.93	0.27	0.53
南部	0.83	0.72	0.17	0.76	0.59	0.82	1.00	0.41	1.29	0.71	0.29	0.53	0.53	0.59	0.94	0.35	0.18	0.98

定点あたり報告数 経年変化(2011年第1週~2020年第53週)




エ 感染性胃腸炎

2020年の感染性胃腸炎の報告数は6,092人で、定点当たりの報告数の年平均は2.02であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。

週別定点あたり報告数は、第8週までは例年と同様の推移であったが、以後報告数が減少し例年のような春期と冬期の流行がみられなかった。

年齢別患者報告数は20歳以上の1067人が最も多かった。

0～9歳における年齢別患者報告数は1歳が858人と最も多く、2歳の561人、3歳の543人と続き、0～4歳で全体の48.2%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	1.45	5.13	4.43	4.96	4.64	4.16	4.09	4.45	3.14	2.07	1.96	1.64	1.73	1.54	1.02	0.77	1.05	0.89
北部	1.93	7.00	5.64	5.86	6.43	6.36	4.79	4.43	3.50	2.50	2.71	1.64	2.00	1.14	1.00	0.93	0.50	0.71
西部	5.78	7.78	7.22	8.22	5.11	4.00	5.33	6.11	4.67	2.44	2.44	1.89	2.67	2.44	1.56	1.00	0.67	0.89
東部	0.07	1.93	2.07	2.47	3.13	2.53	2.13	2.60	1.53	0.60	0.73	1.27	0.80	0.67	0.47	0.33	1.00	0.33
南部	0.06	5.00	4.06	4.72	4.28	3.89	4.56	5.17	3.44	2.78	2.17	1.83	1.83	2.11	1.22	0.89	1.72	1.50

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.71	0.73	0.89	0.89	1.05	1.63	1.84	1.88	2.00	1.88	1.74	1.56	1.91	1.65	0.67	1.54	2.00	1.93
北部	0.50	0.50	1.21	1.29	1.21	1.36	1.71	1.50	1.79	2.43	1.79	1.50	1.64	1.43	0.86	1.43	1.43	1.64
西部	0.89	0.67	1.00	0.33	1.00	2.10	1.10	2.70	2.70	2.00	1.70	1.60	2.00	2.90	1.20	1.30	2.00	2.00
東部	0.40	0.40	0.40	0.53	0.73	1.13	1.73	1.00	0.93	0.93	0.67	1.13	1.80	0.47	0.07	1.33	0.73	0.80
南部	1.06	1.22	1.00	1.17	1.22	2.00	2.44	2.44	2.67	2.17	2.61	1.94	2.17	2.11	0.72	1.94	3.50	3.06


週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	1.98	1.67	1.82	1.71	1.54	1.71	1.75	1.77	1.80	1.68	2.29	2.09	1.77	2.27	2.14	1.96	1.46	2.02
北部	1.79	1.29	0.50	2.00	1.29	2.29	1.14	1.21	1.79	1.93	2.14	2.21	1.86	2.71	2.14	1.86	1.07	2.14
西部	2.10	1.70	1.80	1.50	1.50	1.60	1.50	1.90	2.20	0.60	3.60	1.50	1.50	1.80	1.20	1.50	3.90	2.47
東部	1.07	0.87	1.13	0.60	1.20	0.73	1.20	1.20	1.20	1.20	1.27	1.40	1.00	1.47	1.33	0.87	0.60	1.10
南部	2.83	2.61	3.44	2.59	2.06	2.18	2.88	2.65	2.12	2.53	2.53	2.94	2.53	2.88	3.41	3.29	1.12	2.48

定点あたり報告数 経年変化(2011年第1週～2020年第53週)




オ 水痘

2020年の水痘の報告数は509人、定点当たりの報告数の年平均は0.17であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。
2014年10月の水痘ワクチンの定期接種導入以降は報告数が減少している。
年齢別患者報告数は10～14歳の66人が最も多く、5歳の56人、6歳の55人と続いた。



定点あたり報告数 経年変化(2011 年第1週～2020年第53週)




カ 手足口病

2020年の手足口病の報告数は187人、定点当たりの報告数の年平均は0.06であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。


夏型感染症である手足口病は、2011年に変異したCV-A6による大流行が起こってから、1年おきに大きな流行がみられるが、2020年は流行年には当たらず、少ない報告数であった。

年齢別患者報告数は、1歳の53人が最も多く、2歳の45人と続き、0～4歳で全体の81.3%を占めた。



《ブロック別・週別定点あたり報告数》	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.04	0.21	0.07	0.11	0.05	0.09	0.05	0.04	0.05	0.00	0.05	0.04	0.11	0.16	0.09	0.14	0.07	0.09
北部	0.14	0.14	0.07	0.14	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.14	0.50	0.14	0.21
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.33	0.07	0.20	0.07	0.20	0.13	0.07	0.07	0.00	0.13	0.07	0.13	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
南部	0.00	0.28	0.11	0.06	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.22	0.44	0.11	0.06	0.11	0.06
週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.02	0.04	0.02	0.07	0.07	0.18	0.12	0.05	0.05	0.04	0.02	0.07	0.09	0.12	0.04	0.05	0.11	0.12
北部	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.14	0.36	0.14	0.07	0.07	0.00	0.07	0.21	0.07	0.14	0.00	0.21	0.21
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.10
東部	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.20	0.07
南部	0.06	0.06	0.06	0.17	0.22	0.28	0.11	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11
週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.05	0.09	0.04	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.05	0.05	0.04	0.02	0.04	0.04	0.00	0.06
北部	0.00	0.21	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.08
西部	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.03
東部	0.13	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
南部	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.07

定点あたり報告数 経年変化(2011 年第1週～2020年第53週)




キ 伝染性紅斑

2020年の伝染性紅斑の報告数は189人、定点当たりの報告数の年平均は0.06であった。2020年は過去10年において4番目に少ない報告数であった。

伝染性紅斑は約4年毎に流行する傾向があり、2019年は流行がみられ、2020年当初はその流行が引き続きみられたが、4月以降報告数は著減した。

年齢別患者報告数は5歳の33人が最も多く、4歳の25人、3歳の24人と続いた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.09	0.43	0.39	0.29	0.38	0.21	0.16	0.25	0.11	0.09	0.14	0.14	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.00
北部	0.29	0.57	0.50	0.36	0.29	0.00	0.07	0.57	0.29	0.14	0.29	0.21	0.14	0.07	0.07	0.00	0.14	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.11	0.22	0.11	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.11	0.22	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.07	0.67	0.40	0.33	0.67	0.33	0.33	0.00	0.07	0.20	0.20	0.00	0.07	0.13	0.27	0.13	0.07	0.00
南部	0.00	0.33	0.50	0.28	0.28	0.33	0.17	0.17	0.06	0.00	0.06	0.22	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.04	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
北部	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.06
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.08
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
南部	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

定点あたり報告数 経年変化(2011 年第1週～2020年第53週)




ク 突発性発しん

2020年の突発性発しんの報告数は988人、定点当たりの報告数の年平均は0.32であった。2020年は過去10年において2番目に少ない報告数であった。

突発性発しんは、季節変動や年次による差異がほとんどないが、2020年においても特段の変動はみられなかった。

年齢別患者報告数は1歳が538人と最も多く、6～11ヶ月の254人と続き、両者で全体の80.2%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.05	0.23	0.21	0.18	0.29	0.25	0.16	0.23	0.18	0.13	0.20	0.25	0.32	0.27	0.32	0.30	0.21	0.16
北部	0.07	0.14	0.36	0.21	0.50	0.64	0.14	0.29	0.14	0.07	0.29	0.36	0.79	0.64	0.57	0.43	0.29	0.14
西部	0.22	0.44	0.11	0.22	0.44	0.11	0.11	0.00	0.22	0.22	0.11	0.22	0.22	0.22	0.11	0.22	0.56	0.11
東部	0.00	0.27	0.27	0.20	0.13	0.20	0.13	0.33	0.20	0.07	0.07	0.07	0.07	0.13	0.20	0.07	0.00	0.20
南部	0.00	0.17	0.11	0.11	0.17	0.06	0.22	0.22	0.17	0.17	0.28	0.33	0.22	0.11	0.33	0.44	0.17	0.17

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.21	0.30	0.27	0.34	0.48	0.51	0.47	0.47	0.53	0.40	0.60	0.46	0.60	0.30	0.37	0.47	0.56	0.53
北部	0.43	0.43	0.50	0.29	0.50	0.64	1.07	0.93	0.64	0.43	0.64	0.86	1.00	0.29	0.50	0.64	0.64	0.57
西部	0.33	0.22	0.33	0.44	0.67	0.20	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.80	0.20
東部	0.13	0.20	0.07	0.13	0.33	0.27	0.20	0.27	0.47	0.20	0.60	0.20	0.27	0.20	0.33	0.53	0.33	0.67
南部	0.06	0.33	0.22	0.50	0.50	0.78	0.22	0.33	0.56	0.61	0.61	0.44	0.72	0.33	0.22	0.28	0.56	0.56

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.32	0.39	0.25	0.39	0.30	0.36	0.36	0.29	0.23	0.34	0.34	0.41	0.29	0.39	0.18	0.27	0.11	0.32
北部	0.71	0.71	0.07	0.36	0.36	0.43	0.29	0.43	0.43	0.36	0.79	0.71	0.07	0.64	0.29	0.36	0.14	0.46
西部	0.20	0.20	0.40	0.60	0.40	0.30	0.60	0.20	0.10	0.20	0.10	0.50	0.40	0.40	0.10	0.40	0.00	0.31
東部	0.07	0.27	0.20	0.40	0.20	0.07	0.27	0.20	0.13	0.33	0.20	0.07	0.13	0.27	0.20	0.07	0.07	0.21
南部	0.28	0.33	0.33	0.29	0.29	0.59	0.35	0.29	0.24	0.41	0.24	0.41	0.53	0.29	0.12	0.29	0.18	0.32

定点あたり報告数 経年変化(2011年第1週～2020年第53週)





ケ ヘルパンギーナ

2020年のヘルパンギーナの報告数は450人、定点当たりの報告数は0.15であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。

ヘルパンギーナは夏型感染症であり、例年夏期に流行がみられるが、2020年は流行がみられなかった。

年齢別患者報告数は、1歳の193人が最も多く、次いで2歳の107人、3歳の44人と続き、0～4歳で全体の92.4%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.00	0.04	0.02	0.00	0.02	0.05	0.05	0.00	0.02	0.00
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.07	0.00	0.07	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.11	0.06	0.00	0.06	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.02	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00	0.04	0.00	0.14	0.04	0.05	0.09	0.14	0.21	0.16	0.18	0.28	0.35
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.14	0.07	0.21	0.14	0.36	0.36	0.50	0.29	0.14	0.14
西部	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.10	0.50	0.10	0.20	0.10	0.30
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.07
南部	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.17	0.06	0.00	0.00	0.11	0.00	0.06	0.22	0.72	0.78

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.47	0.51	0.58	0.46	0.27	0.54	0.55	0.52	0.43	0.13	0.25	0.25	0.27	0.27	0.11	0.11	0.04	0.15
北部	0.64	0.43	0.29	0.36	0.21	1.14	0.36	0.21	0.14	0.07	0.21	0.07	0.14	0.07	0.14	0.14	0.00	0.14
西部	0.40	0.10	0.20	0.30	0.20	0.10	0.40	0.00	0.70	0.10	0.10	0.20	0.30	0.50	0.10	0.30	0.20	0.12
東部	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.07	0.07	0.33	0.07	0.40	0.40	0.00	0.07	0.00	0.04
南部	0.72	1.22	1.44	1.06	0.59	0.76	1.12	1.53	0.82	0.24	0.29	0.59	0.24	0.18	0.18	0.00	0.00	0.26

定点あたり報告数 経年変化(2011年第1週～2020年第53週)





コ 流行性耳下腺炎

2020年の流行性耳下腺炎の報告数は165人、定点当たりの報告数の年平均は0.05であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。

流行性耳下腺炎は2010年と2016年に大きな流行があり、約4～5年毎に周期的流行をみせるが、2020年は大きな流行はみられなかった。

年齢別患者報告数は、4歳の25人、5歳の22人、8歳の22人と続いた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.00	0.04	0.09	0.07	0.02	0.02	0.13	0.02	0.05	0.05	0.07	0.09	0.04	0.00	0.05	0.04	0.05	0.07
北部	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.07	0.14	0.00	0.07	0.07	0.14	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
西部	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.33	0.00	0.22	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.11
東部	0.00	0.13	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
南部	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.11	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.11	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05	0.02	0.04	0.04	0.12	0.09	0.09	0.12	0.04	0.11
北部	0.14	0.14	0.07	0.07	0.00	0.14	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	0.21	0.21	0.07	0.36
西部	0.22	0.11	0.00	0.11	0.22	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.10	0.00	0.20	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00
東部	0.13	0.00	0.13	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.13	0.07	0.07	0.00	0.13	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.17	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.04	0.07	0.07	0.04	0.09	0.04	0.04	0.04	0.02	0.05	0.07	0.04	0.05	0.02	0.07	0.04	0.04	0.05
北部	0.14	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.14	0.07
西部	0.00	0.20	0.20	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.08
東部	0.00	0.13	0.07	0.00	0.13	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.07	0.13	0.00	0.13	0.07	0.00	0.05
南部	0.00	0.00	0.06	0.00	0.12	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03

定点あたり報告数 経年変化(2011年第1週～2020年第53週)





2) インフルエンザ定点把握疾患

インフルエンザ

2020年のインフルエンザの報告数は12,622人、定点当たりの報告数の年平均は2.89であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。

週別定点あたり報告数では、警報レベル開始基準値である30を超えることはなくピークは第1週の24.76であった。また例年11月ごろには定点あたり報告数1を超えて流行期入りするが、2020年は極めて報告が少なく流行期入りしなかった。年齢別患者報告数は、10～14歳が1,988人と最も多かった。

2019-2020シーズンの検出状況について、A型はAH1pdm09亜型が70例、AH3亜型が6例、B型はVictoria系統が29例検出された。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	24.76	23.37	20.76	19.91	15.60	9.21	9.76	9.93	9.88	5.43	1.98	1.10	0.49	0.23	0.10	0.02	0.00	0.00
北部	27.45	27.90	26.75	21.75	17.30	12.50	11.65	13.95	14.25	8.25	3.90	0.80	0.45	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00
西部	83.14	38.29	34.86	30.43	25.29	11.21	17.21	13.43	12.86	5.00	1.93	3.50	1.14	0.50	0.21	0.14	0.00	0.00
東部	4.18	17.86	11.00	11.36	10.95	7.50	6.59	7.95	7.91	4.41	1.23	0.45	0.45	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
南部	8.65	16.50	16.81	20.08	13.00	7.04	6.96	6.62	6.58	4.35	1.15	0.58	0.19	0.19	0.04	0.00	0.00	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.07	0.00	0.00	0.21	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.06	0.09	0.02	0.07	0.07	0.02	2.89
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	3.54
西部	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.13	0.27	0.00	0.07	0.27	0.47	0.00	0.33	0.40	0.13	5.32
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	2.05


定点あたり報告数 経年変化(2011年第1週～2020年第53週)



3) 眼科定点把握疾患

ア 急性出血性結膜炎

2020年の急性出血性結膜炎の報告はなかった。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


定点あたり報告数 経年変化(2011年第1週～2020年第53週)



イ 流行性角結膜炎

2020年の流行性角結膜炎の報告数は113人、定点当たりの報告数の年平均は0.13であった。2020年は過去10年において最も少ない報告数であった。

年齢別患者報告数は、20歳以上の報告が全体の84%を占めていた。



《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.00	0.19	0.00	0.06	0.12	0.29	0.12	0.18	0.29	0.24	0.06	0.06	0.41	0.12	0.12	0.12	0.18	0.24
北部	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.20	0.40	0.20	0.60	0.00	0.20	0.80	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
東部	0.00	0.20	0.00	0.00	0.17	0.33	0.17	0.00	0.33	0.17	0.00	0.00	0.33	0.00	0.17	0.17	0.50	0.50
南部	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.06	0.00	0.00	0.12	0.06	0.00	0.12	0.18	0.00	0.06	0.06	0.12	0.06	0.00	0.24	0.24	0.24
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
西部	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	平均
市	0.35	0.06	0.06	0.12	0.35	0.12	0.18	0.06	0.18	0.00	0.35	0.24	0.06	0.12	0.06	0.06	0.00	0.13
北部	0.40	0.00	0.00	0.00	0.80	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.12
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
東部	0.50	0.17	0.00	0.33	0.17	0.00	0.17	0.00	0.50	0.00	0.67	0.50	0.17	0.33	0.17	0.00	0.00	0.16
南部	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

定点あたり報告数 経年変化(2011 年第1週～2020年第53週)

