

がいらいこんちゅう

きけんな外来昆虫

ヒアリ・アカカミアリ

さわったらあかんで～！



ヒアリ

出典：環境省



アカカミアリ

出典：環境省

【ヒアリ】

世界各地に進出しつつある南米が原産のアリ（2.5～6mm）です。おしりにある毒針で刺されると、痛み、かゆみ、発熱、じんましん、激しい動悸などの症状が現れます。強いアレルギー症状を引き起こすこともあります。

詳しくは：[大阪市ホームページをご覧ください。](#)（サイト内検索にて **ヒアリ** をクリック）

【アカカミアリ】

アメリカ南部～中米が原産のアリ（3～5mm）で、国内では過去にも見つかったことがあります。日本では硫黄島に定着していることが確認されています。毒針で刺されると、痛み、水疱状の腫れなどの症状が現れます。ヒアリに比べると毒性が弱いと言われています。

○見つけても**素手**で触らない

毒針で刺される可能性があります。

○刺されたと思ったら・・・

20～30分程度安静にして、体調に変化がないか注意してください。**必要に応じて皮膚科、小児科、内科などの医療機関を受診してください。**また、容体が急変した場合は、救急車を要請するなど、すぐに医療機関へ行きましょう。受診の際は、「アリに刺されたこと」「アナフィラキシーの可能性があること」を医師に伝えましょう。

<お問い合わせ>

ヒアリの簡易的な見分け方

肉眼で

- ・赤っぽくツツツツしている。腹部の色は暗めの色
- ・働きアリは 2.5mm ～ 6mm の大小様々なアリがいる
- ・行列を作り餌に集まる


ヒアリでないもの

- ・黒いアリ（ただし海外には黒いヒアリ類もいます）
- ・2.5mm 以下の小さいアリ
- ・赤っぽいアリでも大きさに大小の差はほとんどない




ヒアリ

顕微鏡で



大小様々なサイズが混在するアリ



ヒアリには 2.5mm～6.0mm と様々な大きさの働きアリがいる。ただし、オオズアリ属のように大型の働きアリで頭部だけが極端に巨大化するようなことはない。

◆ ヒアリと似ている在来種



ヒメアリ属

体長 1.5mm～3mm。
触角のこん棒部分は3節。
刺されてもあまり感じない。



クシケアリ属

体長 3.0mm～5.5mm。
胸の後背部（前伸腹節）にトゲ。お尻の毒針で刺すことがある。



オオズアリ属

体長 1.5mm～4.5mm。
頭部が大きい兵アリがいる。
刺さない。

◆ アリと間違いやすいクモ



ヤガタアリグモ

アリグモ属

体長♂: 5～6mm ♀: 7～8mm
アリに似ているがクモの仲間である。（脚が4対（8本）である前脚を触角に似せている）