武田社ワクチン (ノババックス) 医療機関向け説明資料

接種にあたっては、厚生労働省及びワクチンメーカーのサイトをご参照のうえ、必ず最新の添付文書及び資料等をご確認ください。

大阪市保健所 感染症対策課

<u>令和5年10月19日改訂</u>

赤字・<u>赤下線</u>が改訂箇所になります。

目次

- 複数種類の新型コロナワクチンを取り扱う 際の留意点
- ●武田社ワクチン(ノババックス)について
- 武田社ワクチン(ノババックス)による追加 接種について
- ●調剤時の注意点
- ●参考資料

対象者は、 **12歳以上**です

3回目接種以降は、 前回接種から**6か月以上** の間隔をあけて接種


> <u>最終有効期限が12か月から</u> **14か月**になりました



複数種類の新型コロナワクチンを取り扱う際の留意点

複数種類のワクチンを1つの会場(医療機関)で取り扱う場合には、 種類が異なるワクチンを混同しないよう、明確に区分した管理を行うこと

- ●複数種類の新型コロナワクチンの接種を混同しないようワクチンごとに接種日時や接種を行う場所を明確に分けること(時間的・空間的な区分)
- ●同一の冷蔵庫・冷凍庫内において複数の新型コロナワクチンを保管する場合は、容器・管理を明確に分けること
- ●新型コロナワクチンの管理については、必ず<u>複数人での確認を徹底</u>するとともに、接種関連器具・物品を区分し、責任者・担当者を置くこと



介接種対象年齢

すべての接種において、12歳以上

2回目接種は1回目接種から20日以上の間隔をあけて接種可能

◆
↑
3回目接種以降は、前回接種から6か月以上の間隔をあけて接種可能

介和5年9月20日から令和6年3月31日までの秋開始接種期間は、1人1回接
種可能です。その後はオミクロン株対応ワクチンを含め、接種不可となります。

武田社ワクチン(ノババックス)について

	武田社ワクチン(ノババックス)	
販売名	ヌバキソビッド®筋注	
ワクチンキャップの色	ピンク	
剤型	液剤(無色から僅かに黄色い、澄明から乳白光)	
生理食塩水による希釈	不要	
1 回あたりの接種量	すべての接種:0.5mL	
採取回数	10回	
対象者	すべての接種: 12歳以上	
接種間隔	2回目接種	1回目接種から20日以上
	3回目接種以降	前回接種から6か月以上介
保管温度と 期間	◆冷凍保存不可 ◆2~8℃:有効期限まで <u>(2023/12/25まで)</u>	
備考	◆外箱開封後は遮光して保存 ◆使用前に常温に戻す ◆一度針を刺したバイアルの薬液は、初回使用から12時間以 上経過したものは廃棄する。遮光して2~25℃で保存する。	


▲ 3回目接種以降の場合、オミクロン株対応ワクチンと異なり 必ず 6 か月以上の間隔をあけるよう注意してください。

- 参考)・武田薬品工業株式会社 ヌバキソビッド筋注の取り扱いについて https://www.takedamed.com/go-beyond-covid-19.jp/files/public/shitajiki.pdf
 - ・武田薬品工業株式会社 ヌバキソビッド筋注の適正情報について https://www.takedamed.com/medicine/nuvaxovid/proper use/#kaitei

武田社ワクチン(ノババックス)による追加接種について

- 令和4年11月8日から、武田社ワクチン(ノババックス)による追加接種について、オミクロン株対応ワクチンによる追加接種と同様の位置づけとなりました。従って、現時点において<u>令和5年秋開始接種</u>は1人1回の実施を基本としていることから、<u>令和5年9月20日</u>以降に武田社ワクチン(ノババックス)の接種を行った場合も、オミクロン株XBB.1.5対応ワクチンを接種した場合と同様に、当該接種をもって完了となり、以降の接種を行うことはできません。
- 接種間隔は、前回接種回から6か月以上あける必要がありますので、接種間隔にご注意ください。

【令和5年9月20日~: 武田社ワクチン(ノババックス)接種の流れ】



5

調剤時の注意点

- ●使用前に常温に戻す
- ②使用前にバイアルに変色、異物の混入その他の異常がないかを目視で確認する。
 - ・本剤は無色から僅かに黄色い、澄明から乳白光を呈する液
 - ・目視で点検した際に変色、異物の混入やその他の異常を認めた場合は、そのバイアルのワクチンは使用しない。
- ❸吸引の際には容器の栓及びその周囲をアルコールで消毒する。
 - ・吸引前及び吸引毎に容器を静かに回転させ、振り混ぜない
 - ・この操作に当たっては、雑菌が迷入しないように注意する
 - ・コアリング(<u>ゴム栓に対して斜めに針を刺したり、回転しながら刺すことで、ゴム栓が削り取られてしまうこと</u>) を発生させないように注意する

【参照】

薬液(0.5mL)を吸引の際は、コアリングの発生に注意して穿刺してください。

- ✓ 注射針をゴム栓に対して垂直に穿刺してください。
- ✓ 回転させながらの穿刺はしないでください。
- ✓ 2回目以降は同じ場所を避けて穿刺してください。 等

黒線*で示した中央サークルの内側を穿刺してください。 前に穿刺した場所と同じ場所を穿刺しないでください。



参考:武田薬品工業株式会社 ヌバキソビッド筋注の取り扱いについて

- ④バイアルの栓を取り外さない
- 母薬液を他の容器に移して使用しない
- **⑥**一度針を刺したバイアルの薬液は、初回使用から12時間以上経過したものは 廃棄する
 - ・バイアルラベルの空欄(二次元コード横など) に初回の薬液吸引日時を記載する
 - ・遮光して2 ~ 25℃で保存

【国内における本製品のお問い合わせ先】

武田薬品COVID-19ワクチン ワクチン関連特設サイト(日本) 〈組換えタンパクワクチン-武田〉

https://www.go-beyond-covid-19.jp/

武田薬品工業株式会社 くすり相談室

〒103-8668 東京都中央区日本橋本町二丁目1番1号 フリーダイヤル 0120-566-587 受付時間9:00~17:30 (土日祝日・メーカー企業休業日を除く)

【厚生労働省ホームページより参考資料】

新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (初回接種(1・2回目)用)

説明書

新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (追加接種(令和5年秋開始接種)用)

12~15歳のお子様の保護者の方へ (初回接種(1・2回目)用)

12~15歳のお子様の保護者の方へ (追加接種(令和5年秋開始接種)用) https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite/buny a/vaccine_yoshinhyouetc .html#h2 free2

被接種者向け

武田社ワクチン(ノババックス) 接種後の注意点

https://www.mhlw.go.jp/content/001148976.pdf

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する 医療機関向け手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/000971813.pdf

【武田薬品工業株式会社ホームページ】

ワクチンの取り扱い

添付文書

https://www.takedamed.com/medicine/nuv axovid/

ヌバキソビッド筋注の接種を受ける方へ