

小児・乳幼児用新型コロナウイルスワクチン種別の取扱いについて 令和4年12月1日現在

	希釈量	初回接種			追加接種		使用期限			
		接種回数	接種間隔	1回接種量	接種間隔	1回接種量	冷凍 -20℃ ±5℃	冷蔵 2~8℃	室温 8~ 30℃	希釈後 又は針 刺し後
6カ月～4歳用 ファイザー社 ワクチン	生理食塩液 2.2mL	3回	2回目は3週間 (18日以上の間隔 をおいて、原則20 日の間隔をおく) 3回目は2回目 の接種から8週間以 上 (55日以上間隔 をおく)	0.2mL	不可	不可	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 解凍後の再冷凍は不可です。 配送時に解凍される為、 冷蔵(2~8℃)で保管を願 いします。 </div>			
			【接種間隔】 3週間 1回目 ←→ 2回目 ←→ 3回目 8週間							
5～11歳用 ファイザー社 ワクチン	生理食塩液 1.3mL	2回	3週間 (18日以上の間隔 をおいて、原則20 日の間隔をおく)	0.2mL	2回目から 5か月以上	0.2mL				
			【接種間隔】 3週間 1回目 ←→ 2回目 ←→ 3回目 5か月							