



しゅこんごう 5種混合ワクチンのお知らせ



【5種混合ワクチン（DPT-IPV-Hib）とは？】


5種類の感染症「ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ（インフルエンザ菌b型）」を予防する不活化ワクチンです。

【対象者】

生後2か月から生後90か月（7歳6か月）に至るまで

【接種方法】

皮下または筋肉内に注射します。



※初回接種の開始が生後7か月以上となっても接種回数は減らず、合計4回接種します

すでに4種混合ワクチン・ヒブワクチンの接種を始めている場合は？

4種混合ワクチンは令和7年7月頃、在庫がなくなり次第、販売終了となります。

すでに4種混合ワクチンとヒブワクチンの接種を始めている方で、同一ワクチンでの接種が完了できない場合、次の方法で接種しましょう。

（1）4種混合ワクチン と ヒブワクチン の回数が揃っている場合

5種混合ワクチン（4種混合ワクチンとヒブワクチン）に切り替えて接種してください。

※最後に接種した4種混合ワクチンにより、切り替えるワクチンが異なります。

母子健康手帳の予防接種記録を確認しましょう。

最後に接種した4種混合ワクチン	→	切り替える5種混合ワクチン
テトラビックの場合	→	ゴービック
クアトロバックの場合	→	クイントバック

（2）4種混合ワクチン と ヒブワクチン の回数が揃っていない場合

回数を揃えるための接種を行ってください。

回数が不足しているワクチン	→	接種するワクチン
4種混合ワクチンの場合	→	3種混合ワクチンとポリオワクチン
ヒブワクチンの場合	→	ヒブワクチン

※回数が揃ったら（1）を参考に接種しましょう。

4種混合ワクチン接種について

詳細は大阪市ホームページをご確認ください



【予防接種の受け方】

〔接種前〕医療機関で予防接種を受けます。

あらかじめ電話で予約の有無、接種日時を確認してください。

〔接種当日〕母子健康手帳と予診票を持参し、医療機関にある実施申込書

に必要事項を記入します。体温を測定し医師の診察により接種できる

かどうかの判定を受けた結果、保護者が同意（サイン）をして接種を受けます。

予診票は予防接種手帳にとじている4種混合ワクチン予診票を読み替えて使います。
ヒブワクチン(単独ワクチン)は接種しませんので、ヒブワクチンの予診票を誤って
使用しないようご注意ください。



【予防接種を受ける前に】

予防接種は体調の良い時に受けてください。気になることや、わからないことがあれば医師に
相談し、十分に理解したうえで接種を受けましょう。

【副反応】

主な副反応は注射した部位が赤くなる（発赤）、しこり（硬結）、腫れる（腫脹）で、全身的な
反応としては発熱、発疹などがあります。非常にまれに重大な副反応として、ショック、ア
ナフィラキシー（急性の強いアレルギー反応）、けいれんなどがあらわれることがあります。
2回以上接種した方は、時に反応が強くなるありますが、通常数日中に消失します。

【予防接種を受けた後の注意】

- 接種後30分は体調が変化することがありますので安静にし、医師とすぐ連絡がとれるように
しておきましょう。
- 副反応の多くは数日以内に出現するため、特にこの間は体調の変化に注意しましょう。
- 接種部位の腫れ、高熱、嘔吐、けいれん(ひきつけ)、その他変わったことがあるときはすみや
かに医療機関を受診しましょう。
- 入浴は差し支えありませんが、注射部位をこするのはやめましょう。
- 接種当日は体調の変化に気を配り、激しい運動は控えましょう。



【各区保健福祉センター問い合わせ】

保健福祉センター	電話番号	保健福祉センター	電話番号	保健福祉センター	電話番号
北 区	06-6313-9882	天王寺区	06-6774-9882	城東区	06-6930-9882
都島区	06-6882-9882	浪速区	06-6647-9882	鶴見区	06-6915-9882
福島区	06-6464-9882	西淀川区	06-6478-9882	阿倍野区	06-6622-9882
此花区	06-6466-9882	淀川区	06-6308-9882	住之江区	06-6682-9882
中央区	06-6267-9882	東淀川区	06-4809-9882	住吉区	06-6694-9882
西 区	06-6532-9882	東成区	06-6977-9882	東住吉区	06-4399-9882
港 区	06-6576-9882	生野区	06-6715-9882	平野区	06-4302-9882
大正区	06-4394-9882	旭 区	06-6957-9882	西成区	06-6659-9882