



4種混合ワクチンのお知らせ



令和7年7月頃、4種混合ワクチンは在庫がなくなり次第、販売終了となります

【4種混合ワクチン（DPT-IPV）とは？】


4種類の感染症「ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ」を予防する不活化ワクチンです。

【対象者】

生後2か月から生後90か月（7歳6か月）に至るまで

【接種方法】

皮下に注射します。



～4種混合ワクチンでの予防接種（4回）が完了していない方へ～

4種混合ワクチンの販売終了に伴い、すでに4種混合ワクチンとヒブワクチンの接種を始めている方で、同一ワクチンでの接種が完了できない場合、次の方法で接種しましょう。

（1）4種混合ワクチンとヒブワクチンの回数が揃っている場合

5種混合ワクチン（4種混合ワクチンとヒブワクチン）に切り替えて接種してください。

※最後に接種した4種混合ワクチンにより、切り替えるワクチンが異なります。

母子健康手帳の予防接種記録を確認しましょう。

最後に接種した4種混合ワクチン	→	切り替える5種混合ワクチン
テトラビックの場合	→	ゴービック
クアトロバックの場合	→	クイントバック

（2）4種混合ワクチンとヒブワクチンの回数が揃っていない場合

回数を揃えるための接種を行ってください。

回数が不足しているワクチン	→	接種するワクチン
4種混合ワクチンの場合	→	3種混合ワクチンとポリオワクチン
ヒブワクチンの場合	→	ヒブワクチン

※回数が揃ったら（1）を参考に接種しましょう。

4種混合ワクチン接種について

詳細は大阪市ホームページをご確認ください



【予防接種の受け方】

〔接種前〕医療機関で予防接種を受けます。

あらかじめ電話で予約の有無、接種日時を確認してください。

〔接種当日〕母子健康手帳と予診票を持参し医療機関にある実施申込書

に必要事項を記入します。

体温を測定し医師の診察により接種できるかどうかの判定を受けた結果、

保護者が同意（サイン）をして接種を受けます。



【予防接種を受ける前に】

予防接種は体調の良い時に受けてください。気になることや、わからないことがあれば医師に相談し、十分に理解したうえで接種を受けましょう。


【副反応】

主な副反応は注射した部位が赤くなる（発赤）、しこり（硬結）、腫れる（腫脹）で、全身的な反応としては発熱、発疹などがあります。非常にまれに重大な副反応として、ショック、アナフィラキシー（急性の強いアレルギー反応）、けいれんなどがあらわれることがあります。

2回以上接種した方は、時に反応が強く出ることがありますが、通常数日中に消失します。

【予防接種を受けた後の注意】

- 接種後30分は体調が変化することがありますので安静にし、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。
- 副反応の多くは数日以内に出現するため、特にこの間は体調の変化に注意しましょう。
- 接種部位の腫れ、高熱、嘔吐、けいれん（ひきつけ）、その他変わったことがあるときはすみやかに医療機関を受診しましょう。
- 入浴は差し支えありませんが、注射部位をこするのはやめましょう。
- 接種当日は体調の変化に気を配り、激しい運動は控えましょう。



【各区保健福祉センター問い合わせ】

保健福祉センター	電話番号	保健福祉センター	電話番号	保健福祉センター	電話番号
北区	06-6313-9882	天王寺区	06-6774-9882	城東区	06-6930-9882
都島区	06-6882-9882	浪速区	06-6647-9882	鶴見区	06-6915-9882
福島区	06-6464-9882	西淀川区	06-6478-9882	阿倍野区	06-6622-9882
此花区	06-6466-9882	淀川区	06-6308-9882	住之江区	06-6682-9882
中央区	06-6267-9882	東淀川区	06-4809-9882	住吉区	06-6694-9882
西区	06-6532-9882	東成区	06-6977-9882	東住吉区	06-4399-9882
港区	06-6576-9882	生野区	06-6715-9882	平野区	06-4302-9882
大正区	06-4394-9882	旭区	06-6957-9882	西成区	06-6659-9882