

乳幼児期に受ける予防接種スケジュール（記入用）

なまえ _____ うまれた日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

ワクチン		種類	回数	標準的な接種間隔等	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	12 か 月	15 か 月	18 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	
					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
定期接種（公費）	小児用肺炎球菌※1		不活化	4	27日以上の間隔をあけて3回接種後、4回目は60日以上の間隔をあけ、かつ1歳以降に接種		① /	② /	③ /							④ /								
	B型肝炎※2		不活化	3	27日以上の間隔をあけて 2回接種後、3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をあけて接種		① /	② /			③ /													
	ロ タ ウ イ ル ス	ロタリックス	経口生	2	ロタリックスは27日以上の間隔をあけて2回接種 ロタテックは27日以上の間隔をあけて3回接種 どちらも初回接種は出生14週6日後までに完了してください。		① /	② /																
		ロタテック		3			① /	② /	③ /															
	5種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ）		不活化	4	20日以上の間隔をあけて3回接種後、4回目は6か月以上の間隔をあけて接種		① /	② /	③ /					④ /										
	5 種 混 合 ま た は	4種混合※3 （ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ）	不活化	4	20日以上の間隔をあけて3回接種後、4回目は12か月以上の間隔をあけて接種		① /	② /	③ /								④ /							
		ヒブ※1	不活化	4	27(20)日以上の間隔をあけて3回接種後、4回目は7か月以上の間隔をあけて接種		① /	② /	③ /							④ /								
	BCG（結核）		注射生	1	委託医療機関で1回接種 （保健福祉センターでの集団接種は令和5年3月で終了）					① /														
	麻しん・風しん（MR）		注射生	2	1回目は1歳の時期、 2回目は小学校就学前1年間（年長児）												① /						② /	
	水痘（みずぼうそう）		注射生	2	3か月以上の間隔をあけて2回接種												① /		② /					
日本脳炎		不活化	3	6日以上の間隔をあけて2回接種後、 3回目は6か月以上の間隔をあけて接種																① /	② /	③ /		
任意接種（自費）	※4 流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）		注射生	1～2	1回目は1歳の時期、 2回目は小学校就学前1年間（年長児）											① /							② /	
	インフルエンザ		不活化	2	2～4週の間隔をあけて2回接種						毎年2回（10～12月頃）													

注射生ワクチンと注射生ワクチンの接種は27日以上の間隔をあけてください。

- ※1 接種開始年齢が生後2か月～7か月に至るまでの場合は4回接種となります。（生後7か月以上から接種開始した場合は接種回数は1～3回と異なります。）
- ※2 母子感染予防の対象者※は定期接種の対象外になります。
（※HBs抗原陽性の方の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染する恐れのある方であり、抗HBs人グロブリンの投与に併せて組み換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある方）
- ※3 4種混合ワクチンは令和7年7月頃、在庫がなくなり次第、販売終了となります。
すでに4種混合ワクチンとヒブワクチンの接種を始めている方で、同一ワクチンでの定期接種が完了できない場合は、大阪市ホームページで詳細をご確認ください。
- ※4 日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュールを参照し、主なものを掲載しています。

