


# 乳幼児期に受ける予防接種スケジュール（記入用）

なまえ

うまれた日

年 月 日

ワクチン	種類	回数	標準的な接種間隔等 	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18	2	3	4	5	6	7
				か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	歳	歳	歳	歳
				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
小児用肺炎球菌※1	不活化	4	27日以上の間隔をあけて3回接種後、4回目は60日以上の間隔をあけ、かつ1歳以降に接種		① /	② /	③ /								④ /							
B型肝炎※2	不活化	3	27日以上の間隔をあけて2回接種後、3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をあけて接種		① /	② /				③ /												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">定期接種（公費）</div> <div>                     □タリックス □タテック                 </div> </div>	経口生	2	□タリックスは27日以上の間隔をあけて2回接種 □タテックは27日以上の間隔をあけて3回接種 どちらも初回接種は出生14週6日後までに完了してください。		① /	② /																
		3			① /	② /	③ /															
5種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ）	不活化	4	20日以上の間隔をあけて3回接種後、4回目は6か月以上の間隔をあけて接種		① /	② /	③ /							④ /								
BCG（結核）	注射生	1	委託医療機関で1回接種 （保健福祉センターでの集団接種は令和5年3月で終了）					① /														
麻疹・風疹（MR）	注射生	2	1回目は1歳の時期、 2回目は小学校就学前1年間（年長児）												① /							② /
水痘（みずぼうそう）	注射生	2	3か月以上の間隔をあけて2回接種											① /		② /						
日本脳炎	不活化	3	6日以上の間隔をあけて2回接種後、 3回目は6か月以上の間隔をあけて接種																① /	② /	③ /	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">任意接種（自費）</div> <div>                     ※3 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）                 </div> </div>	注射生	1~2	1回目は1歳の時期、 2回目は小学校就学前1年間（年長児）											① /								② /
インフルエンザ	不活化	2	2~4週の間隔をあけて2回接種																			
				毎年2回（10~12月頃）																		

注射生ワクチンと注射生ワクチンの接種は27日以上の間隔をあけてください。

※1 接種開始年齢が生後2か月~7か月に至るまでの場合は4回接種となります。（生後7か月以上から接種開始した場合は接種回数は1~3回と異なります。）

※2 母子感染予防の対象者\*は定期接種の対象外になります。

(\*HBs抗原陽性の方の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染する恐れのある方であり、抗HBs人グロブリンの投与に併せて組み換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある方)

※3 日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュールを参照し、主なものを掲載しています。

