

# 乳幼児期に受ける予防接種スケジュール

令和8年4月

ワクチン	種類	回数	乳児期												幼児期					学童期	標準的な接種間隔等			
			2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	2	3	4			5	6	7
			か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か	歳	歳	歳			歳	歳	歳
小児用肺炎球菌 <sup>※1</sup>	不活化	4	①②③												④						27日以上の間隔をあけて3回接種後、4回目は60日以上の間隔をあけ、かつ1歳以降に接種 * 初回2回目及び3回目の接種は生後24か月に至るまでに行い、それを越えた場合は行わない。追加接種の実施は可能。 * 初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合、初回3回目の接種は行わない。追加接種の実施は可能。			
B型肝炎 <sup>※2</sup>	不活化	3	① ②												③						27日以上の間隔をあけて2回接種後、3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をあけて接種			
ロタウイルス	経口生	2	① ②																		ロタリックス(1価)は27日以上の間隔をあけて2回接種 ロタテック(5価)は27日以上の間隔をあけて3回接種 どちらも初回接種は出生14週6日後までに完了してください。			
(いづれかを選択) ロタテック		3	① ② ③																					
5種混合(DPT-IPV-Hib) [ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ]	不活化	4	①②③												④						20日以上の間隔をあけて3回接種後、4回目は6か月以上の間隔をあけて接種			
BCG(結核)	注射生	1	①																		委託医療機関で1回接種 *保健福祉センターでの集団接種は令和5年3月で終了			
麻しん・風しん(MR)	注射生	2													①					②	1回目は1歳の時期、2回目は小学校就学前1年間(年長児)			
水痘	注射生	2													①					②	3か月以上の間隔をあけて2回接種			
日本脳炎	不活化	3													①② ③						6日以上の間隔をあけて2回接種後、3回目は6か月以上の間隔をあけて接種			
※3 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	注射生	1 (2)													①					②	1回目は1歳の時期、2回目は小学校就学前1年間(年長児)。2回の接種により免疫がより強化される。			
インフルエンザ	不活化	2													毎年2回(10~12月頃)						2~4週の間隔をあけて2回接種			

■ 接種対象年齢(公費)      ■ 接種対象年齢(自費)      ①~④ 標準接種年齢

- ※1 接種開始年齢が生後2か月~7か月に至るまでの場合は4回接種となります。(生後7か月以上から接種開始した場合は接種回数は1~3回と異なります。)
- ※2 母子感染予防の対象者\*は定期接種対象外です。  
(\* HBs抗原陽性の方の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染する恐れのある方であり、抗HBs人グロブリンの投与に併せて組み換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある方)
- ※3 日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュールを参照し、主なものを掲載しています。