おしらせ

施設名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

「風しん（三日ばしか）」が、発生しています。

● 次のような症状が見られたら、早めに受診を！

- 発熱の程度は一般的に軽い
- 小さいピンク色の細かい発しんが、顔～頭～身体～手足と全身に広がり、約３日で消える
- 耳の後ろや首のリンパ節が腫れ、痛みがある

出典：国立感染症研究所

●もし、風しん（三日ばしか）と診断されたら…

お休みしてください。

【登所(園)のめやす】　発しんがすべて消えていること

こども家庭庁：保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）参照

登所(園)する時は、かかりつけ医に「学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書」等の意見書を記入してもらってからとなります。

【潜伏期間】	16～18日
【感染しやすい期間】	発しん出現の７日前から発しん出現の７日後ぐらい
【主な合併症】	関節痛・関節炎、血小板減少性紫斑病、脳炎

●ご家庭で気をつけること

- 熱がなくて元気でも、発しんが消えるまでは自宅で療養をしましょう。
- 妊娠初期の妊婦さんが感染すると、目や耳や心臓等の先天異常のこどもが生まれることがあります。

ワクチン接種が予防方法です。（MRワクチン）

接種がまだの方は、かかりつけの医師にご相談ください。