

「風しん（三日ばしか）」が、発生しています。

次のような症状が見られたら、早めに受診を！

- ・発熱の程度は一般的に軽い
- ・小さいピンク色の細かい発しんが、顔～頭～身体～手足と全身に広がり、約3日で消える
- ・耳の後ろや首のリンパ節が腫れ、痛みがある



もし、風しん(三日ばしか)と診断されたら...

お休みしてください。

【登所(園)のめやす】 発しんがすべて消えていること

厚生労働省：保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）参照



登所(園)する時は、かかりつけ医に

「学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書」等の
意見書を記入してもらってからとなります。

【潜伏期間】

16～18日

【感染しやすい期間】


発しん出現の7日前から発しん出現の7日後ぐらい

【主な合併症】

関節痛・関節炎、血小板減少性紫斑病、脳炎

ご家庭で気をつけること

- ・熱がなくて元気でも、発しんが消えるまでは自宅で療養をしましょう。
- ・妊娠初期の妊婦さんが感染すると、目や耳や心臓等の先天異常のこどもが生まれることがあります。



ワクチン接種が予防方法です。（MRワクチン）

接種がまだの方は、かかりつけの医師にご相談ください。