おしらせ

施設名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

「百日咳」が、発生しています。

★乳児がかかると重症化しやすい！

● 次のような症状が見られたら、早めに受診を！

- 特徴的な咳（コンコンと咳き込んだ後、ヒューという笛を吹くような音を立てて息を吸う）が長期に続く。
- 夜間眠れないほどの咳がみられ、咳とともに嘔吐することもある
- 発熱することは少ない

●もし、百日咳と診断されたら…

お休みしてください。

【登所(園)のめやす】

特有な咳が消失していること
または５日間の適正な抗菌薬による
治療を終了していること

こども家庭庁：保育所における感染症対策ガイドライン（2018 改訂版）参照

登所(園)する時は、かかりつけ医に
「学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書」等の
意見書を記入してもらってからとなります。

【潜伏期間】　７～１０日
【感染しやすい期間】　抗菌薬を服用しない場合、咳出現後３週間を経過するまで

● ご家庭で気をつけること

- 処方されたお薬は指示通り最後まで飲みましょう。
- 咳き込みがひどく吐くこともあるため、食事は１回量を少なく、回数を多くして、消化のよいものにしましょう。

- ワクチン未接種者がかかると重症化しやすくなります。早めに予防接種をすませましょう。