

# シロアリに注意！

## ◎特徴

大きさは羽シロアリで4.5 mm～9.4 mm。羽の長さは胴体の倍くらいで、4枚ともほぼ同じ大きさなので、他の羽アリとの区別が付きやすい。



日本ペストコントロール協会出典

## ◎生息

日本には現在、約20種類のシロアリが生息していることが確認されています。建築物を加害するシロアリは主に、ヤマトシロアリとイエシロアリです。その他、最近、アメリカカンザイシロアリの被害が増え、問題になってきています。

|      | ヤマトシロアリ                                                                                                 | イエシロアリ                                                                                                   | アメリカカンザイシロアリ                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <br>大阪府ペストコントロール協会出典 | <br>大阪府ペストコントロール協会出典 | <br>大阪府ペストコントロール協会出典 |
| 分 布  | 北海道北部を除く全土                                                                                              | 千葉県以西の海岸線に沿った温暖な地域と南西諸島、小笠原諸島                                                                            | 宮城県から沖縄県まで24都府県で点在                                                                                        |
| 被 害  | 多湿な場所を好み、被害は床下に多い。巢内の個体数は2～3万匹になる。                                                                      | 建物全体におよび、極めて激しい被害を出します。地中や建物に巨大な巣をつくり巢内の個体数は100万匹に達するものもある。                                              | アメリカ産の侵入種。乾いた木材も加害し、被害は建物全体におよぶ。今後、被害が増えると思われる要注意種類である。                                                   |
| 群飛時期 | 4～6月の昼間                                                                                                 | 6～7月の夕方～夜                                                                                                | 6～9月の昼間                                                                                                   |
| 体 長  | 4.5～7.5 mm                                                                                              | 7.4～9.4 mm                                                                                               | 6～8 mm                                                                                                    |

## シロアリとアリの違い

|       |                                                                                   |                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |
|       | シロアリ                                                                              | アリ                                                                                 |
| 触 覚   | 数珠状でまっすぐ                                                                          | くの字型 (まっすぐ伸ばすこともある)                                                                |
| 身体の形状 | ずん胴                                                                               | くびれている                                                                             |
| 羽     | 前後の羽の大きさが同じ                                                                       | 前羽が大きく、後ろが小さい                                                                      |

### ◎シロアリはこんな場所を好みます

家屋であれば、台所・風呂場・洗面所・トイレなどの水回り。また、雨などがかかり易く風通しの悪い場所や柱が土間に接している玄関なども注意が必要です。床下も湿りやすい土台・束柱などは被害を受けやすくなっています。

アメリカカンザイシロアリの被害は、乾いた木材にもおよびます。

床下や庭に木材を置くとシロアリの巣になることもあるので注意してください。ダンボールなども大好物です。きちんと管理しましょう。



日本ペストコントロール協会出典

### ◎駆除

外部に出た羽シロアリは市販の殺虫スプレーで駆除できますが、木材内部やコロニー(巣)にいるシロアリについては、専門業者に駆除依頼するのが望ましい。

**(シロアリの駆除は高額になる場合があります。信頼できる業者数件で見積もりをしてもらい、納得の上で駆除依頼するようにしましょう。)**