

# 塩化ベンザルコニウム（逆性石けん）の使用方法

- ◇ 塩化ベンザルコニウムの原液（10%の濃度）を水道水で100倍に希釈する

## 100倍希釈液の調整方法

塩化ベンザルコニウムの原液  
ペットボトルの蓋1杯分  
（約5mL）



500mLのペットボトル1本分の  
水道水（500mL）

両方をバケツに入れてよく混ぜる

- 使い方**
- ・床や壁 : 雑巾をバケツで希釈した液に浸して拭くか、噴霧機や霧吹きなどに入れて吹きかける
  - ・手指 : 希釈液を洗面器に張り、その中に手を入れて30秒程度もみ洗いする

## 注意事項

- 上記の調整方法は、原液の濃度が10%の場合です。原液の濃度をよく確認してから調整してください
- 汚れが残っていると、消毒の効果は著しく弱まる
- 屋内に散布した場合には、そのまま換気して乾燥させる
- 原液は、まれに手荒れの原因になることがある
- 目に入ってしまった場合には、水でよく洗い流し、医師の診察を受ける
- ペットボトル等に入れて保存すると、誤って飲んでしまう危険がある

お問い合わせ先

淀川区役所 保健福祉課（健康づくり）（区役所2階22番窓口）

電話 6308-9973