

# 令和5年4月から BCG の予防接種は 医療機関のみで実施します

※各区保健福祉センターでの集団接種は令和5年3月で終了



## 医療機関はこちらで確認



大阪市ホームページ

各種予防接種委託医療機関について

検索



Q.いつ頃受けるのがいい？

A. 生後5～7か月の間がおすすめ！  
1歳のお誕生日前日までが接種  
期限だよ！

Q.どのように接種するの？

A. 二の腕の外側あたりに2か所、  
スタンプを押すように接種するよ！

Q.BCGワクチンの効果は？

A. 抵抗力の弱い赤ちゃんが結核  
を発症したり、重い症状の結  
核になることを防ぐことができるよ！



## 私たちを結核から守ってね！



下記番号

06-○○○○-9882

月～金曜日の9時～17時30分（祝日、年末年始を除く）

【各区保健福祉センター】

北区	6313	都島区	6882	福島区	6464	此花区	6466	中央区	6267
西区	6532	港区	6576	大正区	4394	天王寺区	6774	浪速区	6647
西淀川区	6478	淀川区	6308	東淀川区	4809	東成区	6977	生野区	6715
旭区	6957	城東区	6930	鶴見区	6915	阿倍野区	6622	住之江区	6682
住吉区	6694	東住吉区	4399	平野区	4302	西成区	6659		

# BCG接種後の経過について

## 通常経過

接種後4~6週間頃に「赤く腫れる」「うみができる」などの反応が最も強くなります。



写真提供：公益財団法人結核予防会

## コッホ現象について

**接種後数日(10日以内、多くは2~3日後)**で4~6週間頃のような反応が出た場合は注意！  
コッホ現象の可能性があります

**【コッホ現象とは...】**すでに結核に感染している場合に接種後数日でおこる反応です。

この反応があらわれた場合は、検査が必要となりますので、BCG接種を受けた医療機関へご相談ください。



接種部位の経過を写真等で保存しておきましょう。

## 副反応について

「BCG接種した側のわきのリンパ節がはれる」「接種した部分にうみができる」などがありますが、治療を必要としない場合がほとんどです。

予防接種手帳もみてね！



コッホ現象、副反応、気になる症状など心配な事がある場合は、BCG接種を受けた医療機関へご相談ください